

COSTANTI UNIVERSALI .3

VIAGGIO NELLE STRUTTURE FONDAMENTALI

di Ledo Stefanini

1. EQUIVALENTE MECCANICO DELLA CALORIA

- Indica quanti joule di lavoro meccanico sono necessari per produrre gli stessi effetti della somministrazione di una caloria:
- dove

$$L = J Q$$

$$J = 4,184 \frac{J}{cal}$$

- Se si accetta il primo principio, non è più necessario utilizzare unità diverse per misurare il lavoro e il calore; di conseguenza la $L = J Q$ si riduce a mera relazione di equivalenza tra due unità diverse di energia: la *caloria* e il *joule*.

2. COSTANTE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE

- Compare nella legge di gravitazione universale di Newton:
- dove F indica la forza di attrazione che si esercita tra due corpi puntiformi di massa m_1 ed m_2 , rispettivamente, posti a distanza d .

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

- Se si misurano le forze in N, le masse in kg e le distanze in m, il valore della costante di gravitazione è

$$G = 6,6730 \times 10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2}$$

3. COSTANTE DEI GAS

- Stabilisce il legame tra la temperatura misurata con il termometro a gas (temperatura assoluta) e la temperatura centigrada.
Equazione dei gas perfetti:

$$pV \equiv nRT$$

- dove p è la pressione, V il volume , T la temperatura assoluta ed n il numero di moli di gas.
- Il valore tabulato è

$$R = 8,3143 \frac{J}{K \text{ mole}}$$

4. NUMERO DI AVOGADRO

- È basato sull'idea che le masse dei corpi sono la somma delle masse delle molecole di cui sono costituiti. Il numero di Avogadro indica il numero delle molecole che costituiscono una mole, quindi si può interpretare come definizione di mole. $A = 6,02210 \times 10^{23} \text{ moli}^{-1}$

- Si assume che la massa molecolare M di un composto (che è una grandezza microscopica, riferita alla massa dell'atomo di idrogeno) sia proporzionale alla massa molare m (che una grandezza macroscopica) secondo il numero di Avogadro:

$$m(\text{in grammi}) = A \times M(\text{in u.m.a.})$$

5. VELOCITÀ DELLA LUCE

- Il valore attualmente accettato è

$$c = 2,99792458 \times 10^8 \frac{m}{s}$$

- Il numero delle cifre significative è testimonianza dell'importanza che questa costante riveste nella fisica contemporanea. La costante c svolge un ruolo in tutti i fenomeni elettromagnetici. Il fatto che il suo valore sia legato alle costanti che regolano le interazioni elettrostatiche e magnetostatiche dimostra che il suo significato è molto più profondo che quello di una semplice velocità:

$$\varepsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}$$

6. COSTANTE DIELETTRICA DEL VUOTO

- La forza di interazione tra due cariche elettriche puntiformi è descritta dalla legge di Coulomb:
- Per poter sostituire al segno di proporzionalità il segno di uguaglianza è necessario definire operativamente l'unità di misura delle cariche elettriche.

$$F \propto \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

- Definito il *coulomb*,
ne risulta
determinata la
costante di
proporzionalità e la
legge di Coulomb
assume la forma

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

- dove

$$\epsilon_0 = 8,85419 \times 10^{-12} \frac{C^2}{m^2 N}$$

7. UN NUMERO PURO: π

- Com'è noto, π indica la somma degli angoli interni di un triangolo, oltre che il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e il diametro.
- Il suo valore è $\pi = 3,14159\dots$

- Diversamente dalle altre costanti fondamentali (ad esclusione della permeabilità magnetica del vuoto μ_0) π non è il risultato di una misura; ma una conseguenza degli assiomi della geometria euclidea. Pertanto, l'introduzione di questa costante nelle leggi equivale ad affermare che tali leggi sono riferite ad uno spazio per il quale vale la geometria di Euclide.